

АПКЕЧКА ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОИОЩИ  
Для учреждений различного типа и учебных заведений  
(рекомендуемая)

Группы средств	Наименования	Варианты		
		1	2	3
1. Обезболивающие и противовоспалительные	1.1 Анальгин в таб.по ).% №10, уп.	1	2	3
	1.2 Ацетилсалициловая кислота в таб.по ),,% г.№10, уп.	2	3	4
	1.3 Цитрамон в таб. № 6, уп.	3	4	5
	1.4 Гипотермический пакет, шт.	1	2	5
2. Для остановки кровотечения , обработки и перевязки ран	2.1 Жгут с дозированной компрессией, шт.	1	1	2
	2.2 Бинт стерильный 10x5,шт.	2	3	5
	2.3 Бинт нестерильный 7x14, шт.	1	2	5
	2.4 Бинт нестерильный 10x5 или 7x5,шт	2	3	5
	2.5 Бинт нестерильный 5x6, шт.	5	7	10
	2.6 Кровоостанавливающая салфетка с антисептиком или гемостатическая губка, шт.	6	9	15
	2.7 Лейкопластырь бактерицидный 2,5x7,2 или 2,3x7,2 или 3,8x3,8,шт.	15	25	50
	2.8 Лейкопластырь бактерицидный 4x10 или 6x10,шт.	2	5	10
	2.9 Раствор бриллиантовой зелени 1%-10 мл	2	3	5
	2.10 Лейкопластырь 1x500 или 1x250,шт	2	3	5
	2.11 Вата,50 г. уп.	1	1	2
3. При болях в сердце	№.1 Нитроглицерин в таб. по 0,5 мг. уп. или капс. по 0,05г.№ 20,уп.	1	1	1
	3.2 Валидол в таб. По 0,06г. № 10,уп. Или по 0,05 г. № 20,уп.	1	2	5
4. Для сердечно –легочной реанимации	4.1 Устройство для искусственного дыхания «Рот в рот»,шт	1	2	3
5. При обмороке	5.1 Аммиака раствор 10% -10 мл. фл	1	1	1
6. При отравлениях	6.1 Уголь активированный в таб по 0,25г. №10,уп.	1	3	10
7. При стрессовых реакциях	7.1 Настойка валерианы30 мл фл. Или экстракт валерианы в таб. По 0,02г. №50,уп. Или карвалол15 мл, ФЛ	1	1	1
8. При аллергических реакциях .	8,1 Димедрол в таб. по 0,05г.№10, уп. Или аналог	1	1	2
9. Для снятия спазма бронхов	9.1 Эуфилин в таб.по 0,15г. № 10, уп. Или аналог	1	1	2
10. Разное	10.1 Раствор сульфацила-натрия 20% в тубике-капельнице по 1,5 мл.	1	2	4
	10.2 Сода пищевая 50г. уп.	1	1	2
	10.3 Папаверин в таб.по 0,04 г. №10,уп. Или аналог	1	1	2
11. Прочие средства	11.1 Ножницы шт	1	1	1
	11.2 Термометр шт	1	1	1
	11.3 Напальчник шт	2	5	10
	11.4 Перчатки одноразовые (полиэтиленовые, резиновые, латексные). пара	1	1	1